zu Fleischer et al.: Zur Ökologie der Wiesen-Glockenblume (*Campanula patula*) und des Echten Tausendgüldenkrauts (*Centaurium erythraea*) im Magergrünland Nordwestdeutschlands

Tab. 1: Vegetationstabelle der mageren Weidelgras-Weißklee-Weiden – *Lolio-Cynosuretum* Tx. 1937

Tab. 1: Vegetation table of the mesotrophic pastures – *Lolio-Cynosuretum* Tx. 1937

1: *L.-C. lotetosum uliginosi*
- 1.1: Variante von *Alopecurus geniculatus*
- 1.2: Typische Variante
- 1.3: Variante von *Rorippa palustris*
  - 1.3.1: Subvariante von *Juncus acutiflorus*
  - 1.3.2: Typische Subvariante

2: *L.-C. typicum*
- 2.1: Variante von *Rorippa palustris*
- 2.2: Typische Variante
  - 2.2.1: Typische Subvariante
  - 2.2.2: Subvariante von *Rumex acetosella*
- 2.3: Variante von *Bromus hordeaceus*
  - 2.3.1: Typische Subvariante
  - 2.3.2: Subvariante von *Rumex acetosella*

| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |